庫全書

子部

次定四車全書 精名醫類於 欽定四庫全書 萬密齊治羅野松年十六出痘或曰凡出痘者春夏為 夏為順秋冬為逆非以時言以症言也蓋春夏者發 順秋冬為逆今冬出時逆也痘起發頭面要腫今被 續名醫類案卷三十 寒氣遏柳毒不得出故頭面不腫症逆也曰不然春 痘順症 錢塘 魏之琇 撰

自出現而起發自起發而成膿如尚而秀秀而實故 頭面先腫矣或又曰起發太遅宜服温補曰痘無病 生長養之令也秋冬者收斂閉藏之令也痘本陽毒 不須服樂此症紅潤鮮明表氣足也大小便調理氣 不腫岩頂平根澗肌肉鮮紅此為毒威不待起發而 預腫者逆痘也今痘本磊落尖圓堅實其毒輕微故 日春夏為順如應出不出應發不發謂之陷伏故曰 秋冬為逆頭面不腫順痘也頭浮腫者險症也頭面

次定四車全書 異氏子五歲出痘起發時頂順而陷曰順痘也凡出頭 充也無熱無渴無他病也若補之謂之實實此症不, 漸起發得其常也故曰順痘不須服樂己果然 氣血俱有熱也今痘出即密時日未到氣血未周以 至而血不足也平塌灰白者氣血俱不足也掀腫紅紋 以氣血和平為主尖圓堅實者氣也紅活明潤者血 也紅活平陷者血至而氣不足也圓實而色白者氣 十數日 必收屬矣果不樂而安 續名醫類案

徐仲光治一兒痘初標於下頰野部也形平陷氣不足 兒痘起脹頂平而色淡白渴瀉肢冷喜熱飲經曰陰 加木香訶幾治之而愈 作痛便溏有氣凝血滯之象此乃氣虚脾弱之症宜 起胀絕以保元湯加 補中氣以補中益氣湯加蟬蛻肉桂羌活二劑而 少神血不足也六脉沉弱五朝尚暗色不起两腿 兒痘氣虛 |肉桂陳皮調理八朝鴻泄不己

兒痘六日稠密形平塌色黑滞有凝雲掩天庭者有 甚者飲沸湯而不知熱又曰大寒而盛熱之不熱是 草蝉退牛蒡等劑其逆痘俱平浆破漏結痂發疗癰 足幸 脾胃尚强宜補養而煎保固以補中益氣加紫 散又八味丸治之而愈 無火也治之宜益火之原以消陰翳用陳皮散異功 擬鎖項鎖胸者然形色雖逆而四肢紅活綻突唇白 潤起止安寧飲食如常二便 調適雖毒盛氣血不 THE STATE OF THE S

次定四車全書

織名醫類紫

費養恒治一兒因內傷而吐次日見痘甚密一日絕無 はちゃ 送各一兩鹿茸膏大半 盖一劑即綻实如珠根紅頂 然之熱或邪得補而愈盛曰果爾則煩熱躁渴色蒼 老礬紅矣今皮簿色白頭温足冷症可知也乃以參 許二劑亦不應三日加參茂至三錢至四五日畧起 起勢鬆肌透表二劑不應次日以保元湯加薑桂 少 終頂陷囊簿七日加麥茂五錢鹿茸膏半盃仍無沛 數處而愈 13.11 卷三十八

費建中治故友孫貞老子四歲與寅第春痘甚与朗稀 白不一 雨盖泉熱內擾邪火外樂也頭為諸陽之首先賢謂 疎而綻突其熱宜和其神宜夾乃躁亂乾熱頭汗如 為之一驗也今無是症矣二句乃建中之言 泉毒 日聚即肥膿其後收功不假餘力是以補為

次定四車全書 四

毒參陽位者死幸初見勢雖騰涌而毒尚未有定位

月大黄二錢黃連六分石膏生地各三錢佐以蒂丁

續名醫類案

嚴氏子一 青皮判芥蟬蜕木通山查三劑頭汗收熱勢減減 膏黃連加丹皮滑石牛等四劑五朝仍肚熟紅暈如 顆粒不鬆此內有伏毒也以大黄六分石膏生地各 而乏滋潤紅暈未淡胃氣不開熱亦未減寢亦未安 四次前方復用石膏黃連倍加生地至九朝漿甚老 珠此痘起齊毒火盡發也躁亂如前而更渴大便三 再服十二朝漸愈救偏碩言 週痘稀朗且紅潤乃身熱如烙愁楚不堪魚 卷三十八 欠已日軍在島 地斗等判芥木通甘草連翹山查漸愈矣痘初似順 桑蟲日二劑以化毒丹調油胭脂如膏藥貼之次日 紫 滞幸未焦隱前方倍大黄生地黃連減 葛根入大 之者遂勿樂至八朝仍熱叶哭失音頭面擦破身上 痒止紅活又二劑漿足熱和十二朝用紅花地丁生 四次又二劑熱和神定根軍亦鬆宛然順症矣有阻 有伏毒便至如此餘可知矣 錢半荆芥丹皮山查蟬退葛根青皮二劑大便三 續名醫類常 五

臧氏子八歲患痘疳僅存皮骨與寅仲春見痘贏憊如 金分旦是台灣 變七日當內潰也以大黃四錢石膏七錢生地 兩 毒猛熾尚不滌除淨盡功虧一簣矣痘後精神煥發 用大黄斤餘生地石膏二十餘两猪尾十餘稅良以 H 佐以桃仁赤芍荆芥牛莠木通臨服和猪尾血一 血 此似宜培補矣乃身熱如炮目紅如火躁渴不已溺 如膏椒紅點滞此泉毒挾烈火發即內攻若不通 二劑或三劑六日加黃連自始至終一方而已約 一盏 許

ماله الله المالية المالية 張仲文子癸未仲冬忽身熱如火神即昏愦舌刺如煤 然問痘斷非輕劑可挽即用石膏一兩大黃五錢黃 見痘及見則以数記唇猶黑獨血依然至九日後黑 連三錢生地一兩佐以青皮判芥地丁丹皮天寒稍 火上衝水火搏激兩不相下故耳乃全受十餘劑方 唇口焦黑血疵無數溺紅鮮肉問筋惕有如驚悸宛 飲食大進肥肉生長是以濕為補之一驗也 配蜜炒麻黄三分薑一片以行之灌下即嘔費日毒 糖名醫類案

MEN WERETRACTICE CONTRACTOR

金历四月石量 徐仲光治一兒痘紫色而不起脹乃毒盛擁遏也以紫 兒痘六日稠密紫滯平陷不起脹煩躁問亂亦毒感 草紅花蟬退煎酒調獨聖散服之又以犀角地黃治 驗也 日全愈服過大黃十餘兩石膏生地約二斤是早圖之 退津生神氣漸省十二日溺血始淡胃氣日開十六 紅潤起脹而愈 小兒痘毒壅 附 微觸 卷三十八

尺二丁夏 八二 膏五錢一劑者服過五劑至十朝專用參三分托聚 兒痘血熱重初時純與凉血解毒犀角服過二兩石 浆連二服色漸紅活又犀角地黄湯加牛等蟬退痘 糯米乙合渴時即以麥冬糯米綿繭煎湯飲之又發 擁過也但分珠脚斂可治以人中黄每服三分酒調 綻突起脹而愈 水泡數個漿疤暗長灌爛遍身復用茯苓饮仁白芍 十二朝外漿清痂薄用助托樂加綿繭 帯蛾者七枚 續名醫類案

萬世用云原申春家有碩童催十歲患痘瘡症適僕寓 言遂拜更生用扣其所用何劑曰中和湯即十奇散 黄連 銀花甘草生地骨皮山樂蓮肉木通連翹牛夢 育溪曰毋慮吾有除纖樂投之必安不數日果如其 澤偶因舍又有動風微觸覺色點而神昏大為驚懼 鄉之故盧走報急歸視其疾不為不緊且傍有煎炒 荆芥而愈 油膩欲避臭能荷育溪幣也療之恰七日瘡脹而光

金分四月分書

卷三十八

とれ. ういたい 施季泉治臧玉涵次郎年十六因新婚兼酒食忽感痘 是症以石膏一兩人參一兩麥冬五錢枇杷葉橘紅 咸以為不可治至八日漿清寒戰咬牙語語神思恍 **惚咸欲進保元湯大補之施季泉以為不然改用屋** 加沉檀等劑而已餘無他巧幼幼心書 角地黄湯得脱痂後忽嘔吐大便燥結淹延一年繆 仲淳視其舌有裂文曰必當時未曾解陽之毒故有 小兒痘血熱 崎名醫 類案

家弟元著一發熱即語語唇腫齒黑痘欲出不出醫者 孫生東治鄭黄門子痘血熱大盛初起即以犀角地黄 稍定痘漸次而出又减地黄白芍之半復於助聚樂 生地八錢白芍及苓連各二錢稍加發雞日三劑勢 竹茹童便為佐一劑即安再劑膈中如冷物隔定只 治之不效至用白芍八錢一泄毒解徐補收功日上 以為發瘫傷寒也延仲淳季泉不至予曰事急矣以 以人参投之服两許即索粥食晚得大便夙疾與愈 卷三十八

多分四月全書

黄綺雲治 兒痘毒盛又遇火令用白花地丁汁和淡白酒少許 其痘紫立轉紅色同上 不炒矣同上 便此真血熱也若重用解毒輕於補劑則目亦可以 中無清凉之劑九十朝眾始足卒傷一 一兒痘初血熱盛用生地三兩煎膿汁 目醫後方 頻飲

欠己可見公子

ų

續名醫類案

服之立解

兒痘稠密縱突但色紫暗肚熱煩渴語語目赤便秘

多好四月白書 兒痘出夏月起脹而乾紅肚熱煩渴舌燥不眠弱赤 兒痘值六月六朝痘痛煩渴氣急便秘乃心肺實熱 而愈 方加人參三錢前症悉平色見淡白精神疲倦邪雖 度其勢稍減再劑服之又利二次病去其半再以煎 去而正氣不足宜大補之又以保元湯加芎歸芍木 此内外熱極也以黃連解毒湯合化斑湯而愈 乃毒火亢極也以四順清凉飲加大黄六錢微利二 卷三十八

萬密齊治鄒氏之子五歲出痘或與保元湯熱益甚或 兒痘出与朗錠实但枯燥而不能肥澤皮膏皺揭皆 屬於燥經曰燥勝則乾治以養血清金潤燥之劑又 也今痘出而熱轉盛者出未盡也由服保元湯犯實 保元合四物加麥冬治之而愈 也恣與凉水梨汁飲之前症悉平 可以日 以為險曰此順症也期十八日安不須服樂蓋痘不 期算出已盡發已透膿己淌而后收醫可期

大二日日 八十

V

續名醫類案

萬子婦患症大熱大渴眼紅唇裂自利清水妄見妄語 銀好四月全書 實之戒故令出運靨亦遲也夫善政不如善守無他 全大補湯去桂加防風銀花連翹桔梗調理而愈其 表裡俱熱非大發大下之劑不可救也乃以通聖散 痘自下收起亦奇事也 全料大劑與之一服而前症悉去痘出其密復用十 循衣模扑遍身紅斑如蚊迹皆选症也此毒在三焦 何以樂為己而果愈

徐仲光治一兒痘後午餘發熱臉赤色譫妄狂顛乃火 小 兒痘後發熱大小便難瘡廠帯赤或言虚欲用 胃脾則虚宜先調而後消之六君子加山查青皮而 兒痘後身熱減食面黃肌瘦右脉沉滑雖係內傷而 從虚發也以保元湯加歸芍川連而愈 雞而得以三黃九而愈 元湯曰不可此實熱也因食辛熱之物得之果因食 痘 諸熱 保

又引到10年人11年

ব্য

續名醫類案

多分四月石雪 赤 兒痘後夏令痞滿燥熱用巴豆下之心痞少解賜燥 兒痂後能食便秘身熱口渴乃胃有蘊熱也運則變 兒痘後身熱頭痛惡寒拘急腹脹內外俱傷感也以 生三黄九清胃湯利之而愈 愈 腹痛利之如爛魚腦强食即嘔痞嗳不已足附痛 舌 麥蘇丸香 砂丸而愈 溺潘此暑傷元氣熱樂又傷之陰亡而陽獨存也

痘後傷食過用剋伐致面黄少食午後潮熱用清熱 症後大熱無汗乃時行疫症也服截瘟丹五瘟丹而 痘後身熱頭疼過用發散二劑其熱愈甚乃內虚症 症後身熱煩躁面紅唇赤驚掣此熱傷風也由於衣 愈 劑更加泄濕此中氣不足用六君補中益氣即愈 用補中益氣湯而愈 被太暖或近火積温成熱熱極生風以犀角地黄湯

LANDING LINE

續名醫類案

萬密齊治徐氏子痘後發熱或用小柴胡湯竹葉湯黄 金石四月至書 痘後身熱惡寒右脉浮弱由飲食勞役內傷脾胃無 而愈 愈 痘後傷於風寒筋骨疼痛鼻流清涕川歸散加羌防 陽以外護但見風寒即惡發熱頭微疼補中益氣而 連解毒湯皆不效乃與保元湯加當歸炒黑乾薑一 合導赤散而愈

費建中治沈氏女周歲身熱如焚汗出如雨兩目榜徨 P.C.) Dumit Lilling 具橋治汪一龍幼兒患痘方七日痘多而不起四肢皆 服熱去 京痘色如浮萍乾紅枯紫渴甚啜茶水日數十升水 如畏刀鋸以大黄四分黄連三分石膏二錢佐以丹 點磊落分明又二劑熱和神爽稀疎煩潤更以中和 皮木通山查青皮蟬退連二劑次日神色定放標數 之劑八日愈 T 續名醫類案

多分口月五十 劑投之一 神九日而起太禹集 傷矣橋口水寫者挾熱也身凉者熱厥也視其口則 補之既而下結血數枚諸醫辭去橋至則以為火症 為不禁諸醫皆以為寒也违以木香異功散獨參湯 舌有紅斑三語衆曰此非熱而何遂用大補寒凉之 舉皆不然比日身凉飲水多且水寫不止即有熱無 痘汗 服得寐而寫止詰朝四服痘色微紅活有 卷三十八

鲁世禁治衡陽侯自牧次子五歲盛夏泄鴻面垢煩渴 徐仲光治 くこうえ しょう 治之愈 症後盗汗肌瘦煩躁此陽虚也補中益氣湯倍改加 數口面垢渴瀉脉虚細數者此中暑也驚悸發於 麥冬而愈 耳尻冷驚悸診其心肝脉浮而洪大脾肺脉虚而 中暑出痘 痘漿足盗汗此陰虚也保元湯加浮小麥 Q 續名醫類案 十四一 細

費建中治鍾氏小女痘值炎天受暑煩擾非常肚熱如 多安四母全書 常散解利暑毒續投陳氏異功散再加附子與之實 焚痘色乾紅累日不起渴思井水僅與椀許便覺爽 朗求之不止竟飲及一斗通身微汗神情始快痘頓 子之效也幼幼心書 **尻俱冷肝心脉洪大者此痘瘡欲出也先服黄連香の四月生書 ■ **+へ** 起色亦紅活終以清火解毒收功 日鴻止三日瘡見不旬餘而全功此隆暑用附

欠こうり はんから 徐仲光治 **痘八朝漿滿身熱而渴咳有痰涎火盛津液酒也用** 痘起脹煩渴不已寒之不寒是無水也宜肚水之主 以制陽光六味地黄九料加麥冬五味多服而愈 白虎湯愈 湯 那用異功散加山樂白芍喘渴身熱此實症而用補 劑內外皆熱也治以寬中湯又口 趣發疳以清解毒 而愈 一痘漿足漸蒼老宜静以養之有謂脾主結 P 續名 醫額索

金分四月分量 **追六日起脹形色順不食引飲此胃弱也調脾內托** 人十九歲痘六朝勾朗錠突淡白少神渴甚不已此 痘起脹乾紅焦紫根軍堅實便結煩渴黃連解毒湯 而愈 散治之即愈亦有毒壅而不食引飲者不可不辯 朝漿足渴止用人參一斤而愈 以補中益氣湯加枸杞二劑保元湯加冬芍歸祀九 虚弱而津液竭以人參二兩麥冬五錢水煎漸服又

欠到此人 徐 **痘九日空殼無漿根血敢紅肚熟口渴與保元湯** 新婚後出痘躁熱而渴與冷飲即睡醒則復索飲不 黄丸料加人參當歸知母麥冬枸杞子更絲子而愈 渴愈甚此腎水枯涸不能生火宜肚水之主六味地 湯益甚徐用加倍人參用人參二兩麥冬兩半煎成 仲光治一痘八日漿半足熱甚引飲有用保元湯而 頻飲而渴止此渴甚樂輕不能生津以自敢也 痘 發渴 續名醫類教 而

金万四月五十二 **痘七朝潮熱口渴自利下臭機陳積此脾胃熱蒸而** 熱減 新婚後出痘躁熱引飲亦宜肚水制火用八味地黄 九料加人參麥冬五味子又用補中益氣湯而渴 後雖行漿二三日而卒無陰則陽無以化正謂此 已時大冷大寒此亦野水涸不能制火乃孤陽絕陰 下也雖虚而無寒以保元固中之劑而愈若用躁熱 之劑如木香散祸不旋踵 也

でのうる しに 痘後口或舌燥咽乾食少便調此脾胃虚津液不足 痘後熱渴能食便秘赤咽乾口燥此心胃二經受邪 症浆期肚熱煩渴舌乾口躁或疑津液不足與保元 湯如麥冬而熱渴愈甚痘色焦紫此症本熱而衣被 也用參苓白木散及參冬日木升葛麥冬花粉五味 牛蒡而愈 也用白麂湯而愈 火爐過暖用補反助其熱宜清凉以黃連解毒湯加 續名醫類案

多定匹库全書 症黑陷黄色不食性好飲酒順其性與飲紅說而愈 痘火毒閉而形岩死移棄外庭過暴雨而疎甦解此 冬月出痘頂陷紫黑飲食樂餌俱不用以當歸浸酒 痘後口渴食少小便數此食傷胃氣津液不生故渴 與之而痘起脹收功 而溺數也補中益氣湯加麥冬五味而愈 粳米而愈 水制其火也

こ、 う… 萬氏子痘養膿時大渴不止即用前加減方作大劑 萬密齊治鄒氏子痘養膿時大渴不止議用人參麥冬 險追熱壅索飲不已連與井水數升渴止而追起 湯飲之一帖而止 散彼即依本方修合曰瘡太甚津液不足之症白术 **术加升麻生地党粉知母淡竹葉** 燥津液茯苓渗津液皆所禁也乃以本方去茯苓白 痘痛 喷名醫願案 服渴止

徐仲治一痘初起作痒風寒外滞也升麻葛根湯焙 欽定四庫全書 痘漿足而痛不已此諸痛為實也白生陳皮甘草 痘半出過身作痛乃熱毒壅滞未盡外出故也 活命 痘六七痛不已此毒未化止鬱而作痛也非虚非實 勞連翹山查 不須治之俟毒從膿化其痛自止 飲加蟬蜕而愈 痘痒

己門可見 痘九日漿清作痒大補氣血而愈 痘見七 日至十三日 準塌木香散加丁桂固表裡 痘成眾痒破潰爛乃濕火并至也調脾渗濕而愈 痘成漿痒破是衛氣暴寫津液不禁幸能食便潤四 痘起脹淡白神少泄寫口渴而痒此脾胃氣虚也補 芥穗熨而愈 君子湯加芎芍橘復腫灌成痂而愈 中益氣湯去歸加桂附糯米而愈 7:11 **峨名醫類繁** 十九 而

萬密齊治鄭氏子痘将見形作痒不能禁曰起發時作 銀分口唇全書 愈 景傷寒正理論云病身痒此邪在表欲出而不得出 險者 可治逆者不可治纔見便痒書無此症因思 肉虚也建中湯今此身痒正是痘欲出不得出與太 也 陽症同非陽明肌肉虚也乃以各半湯去桂杏加 痒者逆也實膿時作痒者逆也将屬時作痒者險也 桂枝麻黄各半湯陽明經病皮中如蟲行者此 仲 肌

胡氏女七歲痘初發熱兩手如然物狀曰此肝病也經 屠家子出痘贯膿時請一巫誦咒噀水解厭後忽如瘙 痒痘形平塌其色青白而氣腥臭曰犯房室藏氣也 其故老巫他往而子代之有房事 急令買膠栗一斤燒烟薰之痘轉紅活而痒亦止問 麻葛根牛蒡一 云其為病也握宜平其肝以寫青九去大黄加甘草 胡青皮一帖而握止欲再進一帖不聽曰凡肝病 一服庠止痘出甚密調治半月而安

たこうる

7.11.5

绫名醫類象

二 十

施季泉治臧玉孟切兒甫半周身熱一日即見痘耑門 者多水泡而作痒宜止之未發之前既不信七日後 帖痒止再服著痂而安 守嚴密樂用凉劑與前治大别七朝大發痒作渴 子疑應問施至曰此險症且戒云必發痒異常須看 朝固辭去藥以保元湯為主擬六朝多用人參加附 再議至六日盡抓破矣乃用保元湯加防風白生 云樹小花多項平脚塌根窠薄百死一生之症也五

こうこ ここう 咸謂必無幸矣施怡然自若因强之用參必不許乃 戒曰慎防痘疗口疳疗之發也必在腦後枕骨間當 胎又加炒黄連白胎去到底不用參十九朝而別又 加炒黑黃連寫止十三朝復發痒口渴唇燥舌生白 日夜二十餘行或樂水或乳或湯飲俱傾注不變色 白散為好不數日發行口生疳如其言治之輕 以収口膏貼之禁用渗藥口疳惟君家人中 廣筆記 續名醫類省

舒定匹库全書 痘後通身肥瘡失於清解到疼毒內攻而死 痘過身膿瘡久而肌瘦潮熱此毒已外泄宜固正氣 湯加荆莠服而愈 痘感暑毒醫後頭發珠子因用香薷飲合犀角地黃 用百解散發為腫者 用升發使再作後用犀角解毒湯加人參而愈亦有 痘後過身生瘡忽自愈而喘脹搐搦此同倒陷論先 痘後疥癬

欠二百百 公時 膏 女痘順十二朝成膿亦身熱煩燥此毒擁失解也幸 芥白芷牛莠枸杞連翹蔓荆薄蒺菱丹胡麻首鳥各 女十七痘後膿疥逢時即發苦參四兩歸芍芎防荆 散多有损其肢目者矣 為主補中益氣湯如改与茯防銀花石斛外治水銀 正不容 邪以歸芍蒿芳芷防故銀花治愈若失於解 兩黄米糊九盡劑而愈 -續名 醫 類 常 辛二

多分四月 子言 徐仲光治 痘清聚結疤便泄減食疗發二十 餘處因脾胃虚弱 散敷愈 痘漿足發疗數處比熱煩渴便秘能食此有餘之毒 愚按解毒中無補托樂未必無效 其脾胃實强以內托解毒散治之潰出疗根用生肌 正不勝邪毒反內攻解毒無效于十四日 痘疔 一痘清漿結宛四肢 發疗數處能食便調 陷而 死 見

萬密齊治朱大尹子痘至起發時項後手背有二痘變 ていうる たけ 汪氏子八歲痘起發時有黑枯者此痘疗也用四聖 汪氏子痘起發時有變黑者以朱公子事語之赦取 如此者三而卒 **胎汁塗不聽後一身盡成黑痘而塌復出一層又塌** 塗之盡 汁而止次日紅潤起發 黑者模之則痛此痘疔也急取胭脂數帖水浸取汁 **未盡以四順清凉飲治之而愈** 續名醫類案 子芸 胭

銀分四月白書 症 取猪 數 外 死 胭 外 虚 **岩起發有水** 脂 用 同 H 用 後應收 乾 腔導: 肉 汁 胭 以 前 脂塗法者便秘得之 爛煮 調 枯 煩燥 法岩泄渴 法治之而愈此病皮肉 銀針撥開瘡頭塗之 和 不收問之不便七 項 **汁與食腸潤便通旋收醫** 悶 亂者不治 平 而黑内 卷三十八 此虚寒也 服 裡熱 RP 日矣知其傷内 用 凉 内 不 轉紅活亦 保元湯加木香 ÚI. 服 活 解毒加烧 根 四物三黄 脚 不莫 鄭 不 燥 腫 人 八 子 者 湯 結 延 矢

萬密齊治李氏子一歲出痘起發時都似水痘曰痘乃 ことうし シュー 梁大尹公子出痘起發時多成膿泡曰此險症也治晚 臘若皮薄色嬌不可治也乃以四君子湯加黄芪 防 為胗腎為黑陷此乃肝臟之症喜皮肉厚堅而色蒼 胎毒五臟各具一症肝為水泡肺為膿泡心為斑 風牛莠母子同服十三日安 矣越二日痒作而殞 痘水泡附腹 續名 醫 顧食 千四 胛

部分四月全書 鄭氏子九歲出痘起發時額上兩類皆成膿泡曰逆痘 一兒發班身熱口燥舌氧化斑湯及小柴胡湯加黃連 為腹腹成而毒解矣如苗而秀秀而實今方苗而秀 而愈 不可治也痘症自有次序初出一點血化為水水化 恐早於還先姜也七日後更論未及期大痒 呃 痘 夾班 砫 而

欠正可同心 兒發班狂煩面亦咽痛施子仁湯治愈 兒發斑嘔吐利下目赤口瘡黃連橘皮湯治愈 痘後發斑紫色身熱便秘過於温補也四順清凉飲 夏月發班咽痛升麻為根元參甘草桔梗牛蒡子治 發斑 因於胎毒治以犀角地黄湯砭去惡血而愈 有用犀角大青犀角解毒湯 愈 及解毒化班之劑而愈 續名醫類案 主

金牙口尼台雪 夏月發班勢盛狂煩此瘟毒也用五瘟丹黃連陳皮 夏月發斑由於暑毒用化斑湯合香薷飲而愈 發班赤色腹脹便秘此內傷也調胃承氣湯下之 發班紫色煩燥便秘弱赤此毒盛也用黑收九而 肢厥脉沉附子理中湯六君子湯治愈 症出津如錦紋而間有顆粒色赤肚熱煩燥舌胎 發斑身熱頭疼咳嗽由於風熱芎蘇散葛根湯愈 湯治之 而愈 卷三十八 愈 便

ひれつい ととう 萬密齊治羅氏婦年二十七出痘遍身紅斑 顋 無縫色且艶曰此夾斑痘也解去其斑則 其飲食如常大小便調不煩不渴但遍身紅斑 謂不治視其神識精明語言清亮診其六脈調句問 而愈 再 防敗毒散加元參升麻作大劑一 此斑疹並出調胃承氣湯又用白虎湯合萬根湯 服痘起發調理半月而愈 7 **竹名醫類案** 服次早班退痘 痘自 ŧ 如蚊迹成 剋 稠 密

多穴四月全書 本邑各衙出痘先二衙一子一女長子後發熱見紅 之者 疹後報痘不易長大乾咳連聲不續此過於發散也 也必在正出痘時方論以上皆徐仲光所治而 言有不出痘者或發斑或發疹或發水痘皆可折 又四衙家出痘一子發熱亦出紅斑亦亡悉乃信 疑是夾斑症三四日後其斑盡以熱退身凉痘不 痘夾疹 吉 斑

兒身熱咳嗽疹出隱隐以樂發之而不見不沒此風 寒鬱而不散此瘾疹也非正疹論芎蘇散治愈 珍後出痘失於解散四喉 腫痛聲吸水 馆飲食不進 **疹後痘出三日痰咳喘急亦失於解散甘桔莠蒿陳** 枳殼蟬蛻蘇子疎邪解毒清金而愈 倒靨而死 保元湯加貝味甘桔橘紅而愈

2 1. D in 1. 4.15

兒痘出數類而夾疹遍身圆的紅活兩日盡沒有

好名將叛本

ŧ

多定四月全量 而愈 水痘不膿而乾枯身熱煩躁此失解同於倒陷也治 也內症安寧但表邪宜散為根湯加判防翹出二劑 痘報點粗肥有紅盤間有細密隱隱者此水痘夾疹 疹沒非症伏也以劑調之而愈 以葛根湯加荆芥防風連翹牛夢子木通蟬蛻遍身 者曰症沒者必悶亂煩躁此却安静且正痘宛在乃 紅點此餘毒散也又用判防解毒湯而愈

とこの見とか 萬密齊治一女二歲出痘遍身紅點大小相雜無空處 徐仲光治一痘勾朗而甚肥大淡白少神煩躁不寧因 **痘正面勾的紋突少神身肢平塌色暗因手足膿疥** 封頭瘡後用保元湯而愈 淡竹葉木通一服減再服再減三服痘顯而愈 此夾疹夾斑痘也以升麻葛根湯加荆防元參翹蒡 **颐上素患肥瘡太甚耗洩真氣故也先用白芨膏紙** 痘 灰丹 Ų 好名語類宋 え

多分四月五十 痘出腺於後見其疤痕黑大有似症疗須審頭面 在屬後手指療痒遂發血風瘡用苦麥扼翹防風獨 夢送芍婦甘陳防桂术調理而愈此症雖 胛 腫 愈 活於仁哉举蜜丸服并灸風池三里二穴各五七壯 痛洩氣改也恐疑雖满不能以 則必致泄寫而不能收 明初起疎散凉血七八日後根窠紅黑不消亦宜 な三 十八 功 カ 用保元湯加芎 補而不保 痘

兒痘三日耳前紅腫如桃用為根湯加荆芥防風枯 凉血解毒十一二日根軍淡紅宜生血補劑愈 徐仲光治一 更足四軍在馬 梗牛莠而愈 痘匀朗紅潤左腮腫塊青紫熱甚煩躁此痘先塊後 名鬼捏真惡候也急與紫金枚焚散而愈此症若治 遲必毒攻於心發驚竄而死 痘失血 症發熟時如血宜發之升麻葛根湯加荆 衛石蘭斯斯

多プログ 痘 痘正起發而便血怠惰減食作渴肢冷此皆脾虚也 愈 莠而愈 四君子湯加升橘炮畫而愈 而虚矣宜先益氣保元湯加薑附芎歸蟬芍糯米而 本血熱毒壅未盡即服凉藥攻伐之故今血脱毒解 痘四朝吐血痘陷淡白煩躁譫語妄言肢冷身凉此 日根軍赤腫脹淌痛煩渴飲冷便下黑血此熱 June ... 灾軍事全書 痘屬後便下紫血此毒鬱滯下鬱金五錢牛蒡一 毒内藴也犀角地黄治愈 每服五分燈心湯下 這監後咳血不已此毒鬱於肺清金開鬱解毒而愈 痘收醫便下紫血此脾弱而熱傷陰絡也歸芍六君 痘 解毒汤加麥冬犀角丹皮知母牛蒡而愈 收醫身熱咳嗽血痰聲啞鼻如此火刑肺金黃連 湯加炒里荆芎又獨參湯治愈 續名醫類宗

金グロ 痘後血淋口 痘後鴻泄屎後下血此脾弱也小異功 女六歲標點吐紫黑血甚多然而唇舌滋 榆黄連小柴胡湯而愈 順也未可以見點吐血紫黑為死也 順 滑甘草稍竹葉服愈 神寧氣旺竟無悉因女之父素有血症乃遺東非 也故不解毒不補脾而收 乃熱結下焦也怕 t 全症 知通地小薊 雖 险 散 而 症與 潤形色俱 根藕節歸 加升麻地 神自

文正日后 人生 萬密齊曰里中林雪年二十餘染痘初發熱小便血子 萬密齊治李氏女痘膿成將醫忽腹脹且痛氣喘呻吟 尾不可下恐虚其裡不盤也曰病不執方樂貴對症 聞之日不可為矣或問故曰己未春祁水桃村知徐 也詢之因食雞肉糯米飯曰宜急下之或謂痘瘡首 曰瘡既胖壯膿又飽滿其脈弦滑此非痘毒乃傷食 氏出痘死者十八人皆小便血也霄越三月殞 痘傷食 坊 名隔 数 宝 荢

費建中治嚴孝庶子六歲丙戌仲夏見痘乾紅色滞頂 金氏子痘成膿時忽腹脹作痛氣喘煩悶其痘光壮包 金写巴居 白雪 滿 氣此毒火內伙中宫停滯也以大黄二錢青皮錢許 陷不鬆身熱如烙煩躁不寧按其腹膈愁痛口嗳腐 脾積九得利而安 有是病則有是藥下之無妨遂以原物作湯吞丁香 非毒也必會傷食果因麵食過飽亦用前方法得 病稍定再用錢氏異功散加青皮山查一服愈

費見中子二歲孟夏見痘壯熱昏迷乾紅稠密然得分 文色的色 山野 臭因痘前食一学頭圓子重以枳實山查桔梗前 廣皮麥芽赤芍蟬退牛蒡去結屎甚多即起發紅 珠亦不腳塌至三日絕無起勢氣粗煩悶轉矢氣極 漸放白成漿第熱未和前方服至十二朝始收 剩下宿物甚多痘類起色城赤前方加黄連生地 雖甚宏幸獲收功 退荆芥赤芍紅花地丁用山查 崎名開類京 **两煎湯代水連** Ĭ 汝 胡

施氏子痘始事者極其升發四日不起狂煩叫喊至啞 金万四届台書 身大熱色未轉以得通達火毒發見於外也改用凉 雞 目時上竄視其根窠尚在但稠密攀紅頂 桔梗五分佐以荆芥蟬退用山查二两煎湯代水連 袗 此內積重而閉塞也以枳實五錢青皮前胡各三錢 反涼按其胸膈手足皆起診其右手寸關洪滑而實 肉木化者将晚又行一次仍多即頓然起發神安 進兩頭汁次午又進一劑下午去宿垢極多猶有 卷三十八 陷乾滯身

钦定四庫全書 血清解色漸紅活漿漸肥膿而收效 續名醫類常

							==-
结							
續名醫類案卷三十						- 1	
口段						İ	
酉					Ì		
李					1		
卷		.				. [
三		 	\downarrow	İ	1	1	
+			ĺ		1	1	
1						1	
					-		
				.			
	İ				ļ		
- 1						Ì	
			- 1		1		
1					1		
			-	1	1	1	
J		{	- (1	- 1	- 1	

欠三日尾 公野 欽定四庫全書 痘初發熱時惡寒身振動此邪正交争欲出不出也 **痘六日不起服寒戰咬牙腹脹氣急用奇攻散補中** 徐仲光所治痘症甚多下皆其神或者也載之 續名醫類案卷三十九 益氣湯而愈 疽寒戰咬牙 Ų **崎名醫類象** 錢塘魏之琇撰

金历日后人 痘未出齊而手足搖動以異功散投之而更甚此假 痘發熱時悶瞀咬牙此肝熱風也羌活湯加葛芍 痘發熱時咬牙無窟視乃心熱甚也用升麻葛根湯 合導赤散服之而愈 寒實熱水氣大過而無火化也宜平肝制火升麻葛 湯調理而愈 根湯加川芎柴胡防風而愈 用升麻葛根湯加人麥防風桂枝山甲及補中盆氣

ていかい とに 萬密齊長孫二歲染痘發熱三日內寒戰似種其父泣 兒初發熱便咬牙戛夷有聲精神昏慣此逆痘也乃 腎虚症蓋腎主骨齒者骨之餘野水不足則毒火無 足自亂何以濟人此兒元氣充盛毒氣微少邪不勝 制火氣扇動故上下相要有聲陳氏所謂楊者是也 正作寒戰而退試觀症必少也果止五七粒七日愈 曰死矣乃笑曰爾為醫救病如篙工然忽遇風浪手 之而愈 續名 醫 類案

銀好四屆全書 兒痘甚密曰此兒脾胃素弱當用補胃之到使血氣旺 寒戰咬牙失音悉其日此戰乃過身潰爛坐即艱難 非神昏屬齒也失音者欲得肉食不與之日夜啼 而痘易成就也不聽至成腹後過期不審遍身潰爛 果卒 不能自任非鼓領寒戰也咬牙者龈瘡痒相憂而鳴 附 之非咽喉爛嗆水也用調元湯加白並防風暗 一片三劑而安 哭

マニララ たたう 徐仲光治一痘五日形色少神腹脹喘急腸鳴肢冷或 **痘因春夏久雨為寒温之氣所侵不能起者五苓散** 鳴以理中湯加木香陳皮官桂等疏逐冷氣諸症悉 者必煩悶今若便利安寧而虚鳴者乃陰陽二氣不 平又以補中益氣湯調理而愈 和傷冷之症或服凉樂也經曰中虚不足則腹滿腸 内傷者或凝陷伏者殊不知内傷者按必痛陷伏 痘寒析 Į 将名 醫 新紫

费建中治朱氏子稠密乾紅或以色滞便以清火魚升 免好四届 全書 風凛凛此熱毒輕而感寒重毒火為外 發累日不起見其鼻流清涕身凉且静時在春初寒 爐抱兒火邊以酒漿挹火火氣熏兒痘立起 廣等記 江黄綺雲療徐氏兒痘兒幻遇冬月痘不起熾炭圍 加蒼木防風多服之住或平胃快班湯 温 日鼻塞眼封而痘發煌身漸熱清解治毒調理 肌透毒散陳皮換荆芥連二劑身漸暖頓起發 卷三十九 和所別

12 C. 13 mal 2:417 兒三日日紅鼻塞飲涕甚濃氣粗熱肚痘甚稀色滞 兒稠密不輕眉愁腹痛不寐毒盛也蒼白乾滞涕吐 妆 乾 漸起色漸紅活但筋脉時惕以法驅毒而愈 功 稠 丹皮蟬蜕青皮赤芍三劑起發沛然六日肥綻順叙 黏 功 紅無甚內症以荆芥穗葛根前胡黄芩牛蒡木通 頭温足冷邪閉也急疏風攻毒四朝體漸熱痘 續名醫類案

多好四年全書 徐仲光治一兒痘四日溏泄無度四肢厥冷痘點隱 兒痘九日色灰白溏泄厥逆氣應陰陽不相順接 肢為之厥冷也用陳氏異功散 湯 其瀉已旬 痘過 痘厥逆 補中益氣湯加肉果官桂寫止後竟用補中益 調 理而愈 期 不敏便鴻安静四肢 A 押虚以: 附子理中湯數劑寫減肢 卷三十九 而愈 温但脾氣不足用 温 之 又 而

ていりも 兒痘四五日毒己盡形色無神二便自利四肢厥 兒痘七日肢厥減食乃血熱而過服冷劑以致水伏 兒痘六朝綻突焦紫煩躁悶亂喘促厥逆乃陽毒陷 愈 解之而愈 伏厥深熱亦深也以四順飲行二次諸症悉平又清 參附苓陳甘芍山藥木香內果治之破損不成痂而 保元湯加丁桂炮薑而愈 7.14.15 Ų 續名醫類案

部立四年 全書 兒痘後手足厥冷乃脾弱不能旁達四肢用保元湯 兒靨後自言手足冷及按之反熱夜即不安經日外 寧脾陰不足也用歸脾湯而愈 湯連進二服內氣一暖痘即發光紅活四肢温暖又 腹脹發熾裡氣虚弱也稍遲則胃氣脱矣急以理中 加當歸白术附子炮墨而愈 補中益氣湯加丁香城止而愈 而內冷者與弱也內熱而外冷者胃弱也夜即 不

مراء الماسال المالية 萬密齊治汪氏子痘醫後忽然問絕目閉口合令作調 生乃否極泰來之兆所以戒勿擾亂待其自蘇人不 赤未聞有昏瞀也凡痘瘡或出不盡發不透或空殼 或謂恐有餘毒曰餘毒有三一曰於二者癰三者目 邪氣方盛壮火食氣氣益弱矣今邪氣既退正氣將 知此卒見悶絕或呼喚抱持神氣一散不救者多矣 元湯加麥冬濃煎灌之又與粥湯遂愈此正氣素弱 痘昏冒 19 續名醫類常

金分四月全書 徐仲光治一兒卒仆驚搐甦而復作此風寒壅毒紅綿 散治愈 兒鸞搖誤以驚樂凉其心痘不得出而死 無水或清水非體則有餘毒今起發胖壯爛聚飽滿 兒初發熱搖以升麻葛根湯加天麻釣藤木通蟬蜕 枳榖痘出而愈 何餘毒之有哉 痘驚搐

えん)ついま といれ 痘後驚播吐寫肢厥目直痰鳴此中氣不足補中益 痘出二三日驚搖此毒不透心經有邪導赤散加蟬 痘浆期驚搐不止安神養血丸而愈 痘出未盡驚搖且溏泄肢冷異功散四劑而愈 痘初點驚搞不止此心脾虚而血少失治十朝而卒 志石菖蒲春仁蟬蜕而愈 見見點發搖此心血虚而客邪以四物湯加茯苓速 蜕黄連紅花天麻鉤籐石菖蒲而愈 婚名醫 颚策

金石口居台書 应後過食白果驚搖處壅目直腹脹喘急此氣滞生 痘後驚搖氣促痰喘口開目直二便閉濇此類急驚 愈 氣湯為主無醒脾散附子理中湯下至聖保命丹而 痰甘草湯薑湯漸與服得吐寫而愈不可以風治之 乃風邪有餘症宜清凉解散瀉氣以天麻抱龍瀉清 治愈

欠足四事心与 四朝順痘煩躁不食毒未盡也升麻葛根湯補中益 毒也宜升解之升麻葛根湯加桂枝牛蒡紫草而愈 痘未出齊色赤肚熱煩躁清鮮之而益重此反水其 以下亦徐仲光所言 赤散加黄連而愈 順痘日夜啼哭不止此不勝火熾刑金也寫青散導 氣湯而愈 煩燥 續名醫類案

金万里人人 短少淡白不易肥而煩躁真氣弱也綿紙搓軟白发 瘦六朝不起乾紅煩躁此毒壅也過用保元湯而 反 痘後身熱午前煩躁解毒清熱而愈 痘後夜卧不寧此胃不和而衛氣不得入於陰也四 膏封痘服保元湯而愈 問亂焦紫乃以积穀湯先解麥茂之滞犀角地黃湯 物湯加遠志棗仁龍眼內及歸脾湯而愈 蟬夢紫草清其壅滞之熱七朝痘色正後以保元

欠己习事心島 萬密齊治印氏子痘正作膿瘙痒煩哭其面磊落紅紋 煩而死 中氣反傷欲補其中則邪火正盛不可為也是夕加 血不祭魂魄不靖所以煩哭也請樂日欲解其毒則 肝主血藏魂右頰屬金肺也主氣藏魄兩頰木硬氣 膿漿 未熟而頰先紅乾皮肉木 硬曰左頰屬木肝也 湯調理而愈 痘譫妄 N. 續名醫類案

萬密齊治胡三溪子痘時常以手自掩其面身下縮 徐仲光治一痘起脹色焦枯語語此火亢極也以退火 多分口屋台灣 痘密浆其白色昏睡語語此血虚也保元湯加歸地 痘後午餘發睡面赤語語此火從虛發也保元湯加 芎冬茯苓仁春仁 歸芍川連 田生丹無比散治之而愈 呼曰我怕若有所見者曰逆症也經曰腎敗者失志 頻

周璜子年十三染痘祭熱五日痘不出發狂語語已進 盛者解之如無他症不須樂今此子元氣素厚飲食 婦年二十餘發熱五日痘不出常起模林壁昏不知 保元湯三劑矣曰誤矣犯實實之戒也凡痘發熱之 目中見鬼死不治錢氏曰腎病則下竄此痘發於腎 初驚者平之渴者潤之吐利者和之便秘者利之熱 不可為也果然 口喃喃不休口死症也果然

大記可聞 ないち

續名醫類案

徐氏子年十七出痘至膿将醫忽發狂語起舞或殿人 汪少溪婢染痘發熱顛狂曰熱極矣當速解之乃作三 属人皆平日仇恨者一身之瘡盡进破祈禳不效乃 黄汤與服得利熱滅神清痘出而安 七日靨 用安神丸百粒作次服良久始省問其所為夢也 夙强乃以保元汤助火為 邪毒氣鬱過至於狂妄熱 劇矣宜急下之與三黄湯得利而狂止痘出至十

多分四月全書

とこずる ハエト 痘漿灌喘急用荆防桔梗只杏冬貝橘紅炒鹽竹葉 痘稀嫩少神起脹時泄瀉而鳴比氣虚也補中益氣 痘妆靨原亦喘急腹賬因能食非倒靨也保和湯愈 痘浆足痰喘便實此肺熱過於補也积殼湯加連翹 牛蒡腹皮瓜蒌而愈 湯加肉 果而愈 以下亦徐仲光所言 痘 喘急 續名醫 類衆

一多好四月全書 症後喘 吸不已用長流水楊百遍煎清上藥服愈 痘後喘急聲重客水侵肺也蜜炒麻黄桂杏車夢歷 痘後劉喘久不愈審炒麻黄半夏桑皮欸冬花各 痘喘急用白花地丁水煎服即止如神 而愈 妥 錢白果內五斤煎服數劑愈一云有甘杏苓蘇子更 甘草愈

スシンフ・し **痘後痰喘不已火侵肺也用芩連枳杏甘秸花粉柴** 喘 痘八朝俱充灌因暑月汗多解衣熱為風抑忽咬牙 錢杏仁三粒甘草五分丸服愈 痘後痰嗽喘嘔用阿膠糯米各 而愈 痘後泄潟喘急此肺虚也人參一錢五味三錢煎服 胡煎服而愈 泄) 一晝夜頰上有倒醫先用蘇防杏只青及陳皮 皟名醫 類案 兩牛夢兜鈴各三

萬密齊治程氏子未一歲多笑知其心火有餘令以川 多元四年 全書 愈 改术 華貝前鑑得微汗喘緩次用振藝丹三分 隨以 則殆矣 冷乃作清金散湯一服而減半再劑而喘定如不知 忽作喘嘔中涎嚮汨汨有聲此肺熱症幸不肩息作 連山梔辰砂為凡服之三日後突漸少隨染痘發熱 大清九三九小青九五九大靈九三分連進二服 而

ここうし ノニテ 痘七朝不易起脹喘咳吐食此毒壅也清解散而愈 **痘收屬厚而乾黑身熱咳嗽風寒客肝也麻黃湯愈 痘五朝 匀澤紅潤稀朗頂平陷痰歌甚此傷風失表** 痘八朝 順但項平痰嗽重此由失清解治以清補煎 橘姜而愈 邪客肺 行因不信樂十一朝聲啞喘脹倒屬死 痘 經但膿期患此難於補托用甘枯前茶桑杏 Ţ 續名 醫類案 +==

舒定匹库 全書 痘收疤咳嗽咽膈不利用甘桔翹防莠陳皮射干元 痘後傷風咳嗽發熱用解表樂反汗喘用二陳湯 痘後咳嗽連聲不續疾鳴欲絕嗽罷吐白沫面唇 白 痘痰嗽諸樂不效用黑散子而愈 芽五味钩藤而愈 麥而 愈 飲食少不得即此虚而攻肺下痰過劑也小異功 桑杏查反加指溺此脾胃虚弱也補中益氣湯加麥 卷三十九 加口

欠二丁巨二十二 痘久歌 不已腰背痛此野咳也地黄丸加麥冬五味 痘後咳嗽吐膿腥臭胸中隱隱作痛右脉數滑乃餘 痘後風寒痰嗽頻吐和食俱出以清金散治而愈 痘後咳嗽吐 咽此脾傅胃也以六君子湯治而愈 并蒸百合服愈 毒在胸作內癰也用橘貝甘枯苓合翹夢知麥防己 精名醫期祭 中四

之法也

加藿半萎粉冬又用人參清肺飲而愈此救子益母

萬密齊治陶氏子痘将靨咳嗽喘急用甘枯湯加麥冬 金分四月至書 蘇地骨皮一服而安 痘十二朝咳嗽旬餘不止服發表化痰藥多反吐膿 子而愈 牛夢未效此肺有火邪火鬱宜發之乃去麥冬加紫 血 下皆徐仲光所言 此牌肺虚重傷真氣成肝癰也用枯梗湯而愈 痘 恒吐熾

兒年十五血熱毒重而無顆粒正頻晷見分珠而又 查與犀角紫草石膏大黄二劑痘乃稍潤又加芎歸 **莠陳藿石膏黃土澄水煎服隨以桑蟲漿雞腦各二** 催蟄丹退火丹雖起發嘔歲特甚用冷連荆防翹夢 個入催蟄丹震熱丹各五分至夜狂躁作渴以陳冬 冬知甘桔生地丹皮紅花元參痘漸滋長嘔熾漸止 稠密唇焦口腫舌有黑刺大熱大渴先羌活湯調 八九朝復嘔背痘平塌仍用芎歸苓連蟬蒿翹防羌

とこういこ とにて

精名醫類常

金公四母全書 **痘六朝与朗光澤外症順而胃氣損聞食則嫩漿雖** 兒標點歲吐面色枯口唇焦胃氣已脱毒不出三日 兒成漿倒陷吐熾不止急用攻發樂以起其痘於安 胃樂中加麥茂黑薑陳米白木黃泥澄水煎治愈 死 便溏数加茂术查橘炮薑人參三四分調理而愈 米麥冬煎湯頻飲至天明熟睡痘轉而起灌矣但大 滿不能收拾茶老變倒屬而死吐咽者更重 卷三十九

久已日日 白土丁 萬密齊治一兒痘本輕因傷食腹痛而嘔用平胃散加 痘後吐 蝈氣血弱無穀氣以養蛔故出也二陳湯加 痘後煩渴乳多則吐身熱喜凉此餘毒在胃竹葉石 痘後喘嘔以長流水揚百偏煎清上之藥服愈 膏湯治之而愈 痘後城腐有用香砂丸尅伐太過遂變泄寫而死 生薑白芍川連連翹大黄治之而愈 砂仁藿香葉煨薑而嘔止 衛名醫類食 六

库生余光庭年十九出症腹成将屬忽作效逆即處 小兒因食生冷傷脾胃而嘔症變灰白用錢氏異功 小兒膿成将醫忽作乾嘔雖飲食常自嘔歲其痘不 皮痰涎而出用甘桔湯加牛蒡嚬呷之調理而安 小兒痘密甚喉舌都是将閉時宮水嘔食雜膿血痂 散 之言以告之後失聲問亂死 作膿不滿項曰此逆痘也乃誦木陳葉落弦絕聲嘶 加砂仁丁香桂而嘔止

欠己可事在時 咳逆耳促代之脉得之氣逆脉亦逆矣以猪脖尊之 七日未更衣曰此燥矢壅塞下竅不通火炎上竅故 瘡 进脉促而代或謂咳逆者惡症也促代者怪脉也痘 下燥矢效逆即止而脉亦調勾而起 火此火炎上之象乃問其大便何如則自出痘至今 一日水逆三日胃敗皆不合經日諸逆衝上皆屬於 痘 順正飽肚明潤何以得此曰咳逆三症一日胃寒 吐瀉 及 Ų, 鮑 續名醫類常 七七

徐仲光治一痘不見出吐寫不已服升發益盛此虚 多好四月百十 宜温補樂升發以透肌散六君子湯加升雌薑桂陳 痘後吐蛔乃氣血虚無穀氣以養蛔求食而出也 痘後吐渴類霍亂此外感無內傷也藿香正氣散藿 米東而愈以其熱静痘嬌也若執痘未齊而不補真 陳湯加連翹連素薑芍而愈 香五苓散因無暑食加味二陳湯治愈 元反致伏陷矣 卷三十 症

えっかる たな 費養恒治馮憲副孫兩日稠密無維皮薄色淡身凉而 痘起展吐蛔乃胃熱而久不能食蟲為熱迫但聞食 絕無起勢乃如參三錢茂五錢熟附五分日二劑 寒而隣於逆者也以保元湯加芎歸肉桂山甲數劑 静睡不合目而困倦面此白吐蛔數條俱已死此虚 漿半足若久不食而服劑不止者土虚而木乘之必 氣則上湧出安蛔湯而愈然多有不治者雖痘勾朗 至腫消目開倒陷而死 婚名醫類案

費建中治姚氏子秋夜忽吐為三十餘次口不能合兩 多定四年全書 漿肥膿神爽寢食俱安十四日收功因痂乾燥防餘 滿却如水泡有項無盤乃劇虚劇寒之症形象固逆 毒以參歸化毒湯重入忍冬膏調理而安 目失神身不熱痘齊涌出甚細密僅得分珠颗粒圓 幸氣血未離疏通之劑斷不宜用即與保元湯加 至七分幸不渴又加熟地膏半盏鹿茸膏敷匙十日 日漸起色漸紅囊漸蒼老肢體亦暖參茂更加重附

Dellonal LILLA 施季泉治一兒甫半歲身熟即見痘皆以樹小花多頂 术木香當歸熟地訶子等服至六日如常乃倍參武 神爽進食而痊矣虚剧之症補之不足尚可散乎但 半而不蒼老前方去鹿茸肉桂訶子加芍茯苓銀花 加鹿茸肉桂至八九日身得温暖寒囊覺厚漿水及 今無是症矣 <u>混</u> 泄 瀉 塌根軍洗薄為十死一生之症擬以六朝多用 統名唇類紫

免灰四年 生 樂口府只用人中白散前後毫不用補何其識明 黃連而胎渴愈十九朝季泉别而誠曰慎防發疔疳 其疗必發脱後項骨間待自潰以收口膏貼禁用渗 參茂附子施季泉曰此險發痒必甚須看守嚴密竟 湖止十三朝復發痒口渴唇燥舌生白胎仍用炒黑 餘行乳樂湯飲傾注而不變色季泉加炒黑黃連而 用凉樂與前論迎別七朝果發痒作為一日夜二十 **斷確治效如神豈其先得决於身一熱即見痘而多** 而

欠二百年 二六 兒痘寫投以升潘樂不效黃綺雲用白芍樂酒炒 兒虚寒将行災時作寫用炒蓮肉去心 也 且嬌故豫决其為險症發痒乎廣等記 血熱痘無氣虛先用解毒樂毒清矣忽寫日數行不 痒或虚煩躁不止亦如之若係大熱泄瀉者不可用 五分共末白湯下兒小者三分大者五分寫立止虚 兩煎服 同上 一劑即止此牌虚有熱也廣筆記 Ų 續名 醫類案 兩真鴉片

金好四月至書 **痘密毒重起發亦透八朝但頭面胸背腹漿手足止** 痘脾虚作渴用蓮肉六兩參茂五味山英扁豆各四 煎服補其元氣漿頓足而愈蓋因其先解毒盡故可 湯下立止王宇泰復用人參二兩黃三兩鹿茸三錢 補而無他症起也廣筆記 止痘漸平塌繆仲淳以炒蓮肉五分真鴉片半分米 脾泄瀉 更效 兩白术三兩棗肉為九薑湯下此方移治老年腎虚 卷三十九

一痘起 脹時忽 瀉痘色赤而稠根窠 堅实便秘六日 矣 有清泡用參送米拾翹連點薯即痰不食身熱而嘔 大便頻頻失品急加歸芍查陳砂冬防木元參石膏 而目腫赤四肢發癰始悔而用清解病根已深竟損 此血熱毒壅正宜寫去其毒治只宜清解主人恐 山豆根及便製人參兼用牛黃抱龍丸八寶丹連二 耗其元氣用豆熟九保元湯加肉果官桂等痴雖 三劑四肢漿足以後去人參止用清解藥而愈 潟 收

欠己日日か

-

續名醫類案

7

我好四母全書 這早起泄寫飲食不化此脾野不足四君子湯加補 **痘六朝不起 脹灰白昏睡四牙散木香散發之數** 湯 痘隱隱不見面白神疲微熱狼泄此脾虚不能送毒 也 骨脂肉果又朝服四神九夜服參苓白术散而愈 **本通桔梗川芎提之而順愈** 異功散加木通芎升蟬陳米寫止痘發補中益氣 日廢一肢此症有同是熱寫而用犀角地黄湯加 調理愈 卷三十九

痘後 羸瘦枯槁溶泄不已咸謂脾弱理中湯小異功 痘後渴藥食俱不化此即虚也參苓白术散阿附九 而安 散六君子湯皆不效知其乳母弱乳薄故也令易乳 肉豆丸而愈 痘後泄寫不已此脾虚也四君子湯加升防肉果又 而漸愈 而 愈 PEC 、镀 名賢 類常 干二

次定四軍全書

痘溺赤海泄如康肠中熱則瀉黄如麼此煎轉積熱 痘後喰泄此邪熱不殺穀六君子湯而愈 痘後傷食傷暑而寫四苓散合香薷飲加神麥芽山 痘後夏月泄濕腹如雷鳴服調脾樂不效此勝風泄 追未出發盡利下赤白此血熱痘壅有積熱也以為 查而愈 也以五苓散加車前黃連神越來芽山查而愈 寫葛根湯加防柱煨薑得微汗而愈

钦定四軍全書 痘暑月六朝而利下腹血肚熱 煩渴此毒留大肠三 痘靨期而利水殺不分完穀不化參苓白术散芍藥 症後利下蛔蟲此熱迫之也苓甘半芍烏梅川椒薑 獨參湯治愈 黄凡煎 補中益氣湯而愈 倒陷二七两 地黄湯補中益氣湯治愈 根升麻湯加芎歸查麥蟬蜕稍城而目赤溺數犀角 F 死故日險者治之 **航名野初集** 痘同而不治痢久漸 羊三

痘後患利裡急後重面黃不食開藥食則嘔此病 痘後初秋利下白積身熱腹痛嘔熾不食此濕熱疾 樂而城止進食次以木香檳榔九去積盡調中湯而 安 **積魚受寒邪理中涉加防風一割處止平胃散加連** 雖實而胃氣受傷多矣當先補後攻小異功散加芍 聚而愈 青葛查麥愈 那

痘後利下赤白能食而不化此胃熱而脾虚也乃恣 痘後毒入大腸而便膿血者牛黄散三黄散犀角地 痘後利久不止積未盡而中氣不足用人參白木白 痘後暑利保和九香薷飲間服而愈 痘後噤口痢用人參一 **芍甘草升麻陳米大固中氣而愈** 桔梗三錢胃風湯調愈 食而不知節慎遂致莫救 兩陳皮黃連石蓮肉各五錢

欠已の巨合島

W

精名醫類案

萬密齊治胡氏子染痘自利三日不止或欲進理中湯 医分四石 白書 這贈月渴數日而後標點患痢無度用升發藥不效 黄湯黄連解毒湯而愈 日進二劑積少減痘亦紅潤脉始有根然飲食不進 **痘色淡白少神脉浮大無根大虚症也附子理中湯** 完穀不化亦不易結痂小異功散加芍藥木香參苓 用 白术散調理而愈 補中益氣湯加桂枝炮薑遂能食安寢聚雖充而

萬之子三歲出痘至膿成将靨時忽泄瀉痘變灰白先 湯但觀其形色利當自止不必服樂次日痘出利止 君曰此虚寒症命作木香散服之未盡劑泄止瘡復 此乃火盛於內肺金不行收令也以黄芩芍藥湯加 加訶子肉豆熟曰不可此協熱利也宜用黄芩芍藥 紅活時隣人曾氏子痘出密盛将屬亦作寫痘變灰 ,兒發熱時自利大乳如竹筒狀清水流出逆症也 服而利止

欠已日年 白十

Ų

續名醫類彙

于五

蕭別駕女七歲出痘連服保元湯痘密甚曰表裏俱實 金分口月台書 為耳次日為益盛視其痘飽滿紅潤不與樂乃怒甚 食雞戒以不可食不聽日食雞汁至腹将成忽大潟 雖密順痘也不必服樂蕭江西永豐人彼處出痘專 紅活不痒矣 白且作痒來請樂先君即以前未盡劑與之寫止痘 日夜五六次所下皆清水欲止之曰裏氣太實正須 曰 保無他或欲進內豆斃九力止之至第三日大泄

ていする たたっ 痘起 腹成能食一向溏泻未止用錢氏異功散加木 香訶子肉服之愈 痘将醫忽作泄渴口渴飲水小便短少其痘胖肚紅 潤此內熟也用五苓散加黄芩白芍煎調益元散而 愈 子加陳皮調理而愈 腸胃之間今渴者名畜水為也水盡渴自止與四君 行曰鴻止矣問故曰此坐飲雞汁太多水留薄 特名特朝祭 六六

陳三農治一小兒痘後泄寫二三年體瘦腹大善食此 多坑四峰全書 滑瀉不止食少腹脹足冷痘灰白色脉細無力此犯 症成膿面部将靨因渴飲過多以致自利白术散服 痘成膿少食忽作泄寫不止變灰白用木香散豆逸 九服之愈 五 之渴渴俱止愈 馮傷腎腎不納氣肝火起胖無正火不殺殺故作 虚不治必死 巷二十九

萬密齊張氏子症醫時面瘡潰腫腹水浸淫泄下腹血 こうし 李季虬日長兒痘初熱即泄日十數行見痘泄不止時 醫以脾胃藥止之愈甚施季泉曰是在不治予强之 寫瘦削成府耳用紅麵九加草果三錢服之愈 乘熱導之或可望生今逐矣過四日即欲解者無及矣坐視旨死職等 止子 喜甚施口非也毒火熾故泄初泄時即以解利藥 日止泄不難發樂中加黃連二錢黄芩一錢一劑泄 痘痢 2,11 給名醫额作 千七

金庆匹庫全書 徐仲光治一 膿血自愈因思此疾不可急乃故製藥延緩以待之 傷寒太陰經病論則曰熱畜於賜便雕血勿治利盡 後重不食或作禁口痢治不效視其症乃倒醫非 黃連木香一服後重除利稍止再服能食三服痘 靨 數日後度其膿血将盡乃用四君子湯加白芍枳穀 也在痘科中利下腹血痂皮者生水穀不化者死在 爐 大小 一症十九歲 標點時便秘一十二朝不行口 便 FY-痢

起 痘後身熱便秘此餘毒結大腸也解毒湯服而愈 症後身便燥此辛熱耗液潤燥湯愈 **麵二錢而行** 痘後食粽便結痛不可按手足搖獨大柴胡湯加 地 渇 十五歲血熱毒重痘十八朝忽小便 倒竟夕開其大便已阻而不行者四日矣此有燥 知机积穀兔絲子而便利 煩躁左尺脉浮大此陰不足而津液竭也參冬歸 不利欲解不能 酒

欠己习事心事

M

緒名醫類案

千八

痘泄瀉弱潘此陰陽不必五苓散加車通而愈 痘正出而小便秘此氣為火食也導赤散疎解樂而 痘陰陽分而小便少此肺脾虚也補中益氣湯加麥 冬五味愈 愈 之下因 便益急而不能出痛苦極矣且樂力未能達於至 屎結於 逃門後竅不通故前竅亦 閉進以湯藥 用膽導法須臾二便皆通 則 陰

欠正日神台馬 老醫有孫症既脫加少腹脹小便不通衆謂症後餘 痘後小便不利用五苓而愈甚陰囊漸腫此虚陰而 痘後小便赤色知熱在膀胱導赤散加栀本車前竹 毒用利水解毒愈脹老醫忽悟曰此脾虛下陷也痘 葉燈心而愈 痘溺潘為陰虚火炎樂肺六味地黄丸加冬味而愈 中益氣調理愈 渗利之復損其陰也六味地黃九加肉桂車前又補 續名醫類案 主九

萬密齊治庠生余先庭年十九歲染痘發熱五日不 金分口人台灣 尊力小不能通也自立一法取猪尿脬一枚以猪 片煎服愈廣筆記 其中燥糞閉塞肛門腸乾枯氣不得行血不得潤膽 三日未更衣脉細而數雖有下症元氣怯弱不可 後無實症土堅則水清人參一兩大棗五枚生薑五 汁半盃清油半盃蜜半盃三物和勻入脬中如作 以膽尊之不得通病者煩燥因思發熱日久毒流

欽定四庫全書 胡氏子出痘乍熱乍退足冷數日不大便先出者猶是 亦甚今熱不甚順痘也曰不然毒本火毒待熱而發 導法取下燥屎二十餘枚氣通熱解神清痘出此法 大小便難昏昏喜睡此毒火內蘊不得發越表熱雖 如發熱而不煩不渴大小便如常精神清爽者此熱 在表無邪毒火發越而痘易出易醫也若煩燥不安 紅點亦不起發此逆症也或日熱微毒亦微熱甚毒 外意也虞天民亦有此法 **V**\$1 新名醫新章

徐仲光治一兒季春出痘感疫氣亢極便秘用十神 兒季春出痘七朝順朗元極便秘狂煩舌有黑胎 毒湯次以升麻藥治之而愈 者毒火鬱過也見紅點而不起發者毒火陷伏也足 點俱沒煩燥轉甚猶謂此內收也翌日死 冷者火極無水化謂之逆冷也彼不以為然次日 痘疫 内熱則甚今乍熟作退者毒火來往也大便不通 鴻 ŧ 紅

萬密齊云嘉靖甲午春痘毒流行死者十八九乃一厄 治之次以理氣血而愈 這空處隱隱有黑點此感疫失解也先用大承氣湯

飲定四庫全書 災肯之變難以樂解而人事未盡又不可委之天數 主喜曰此解毒神樂也依方修合施售與人但服之 也於是檢閱古方於韓氏醫通得五瘟丹以五運為 也時有豫服三豆子湯絲瓜辰砂散几方書所載豫 解症毒之法用之無效予思痘疹疫癘之毒因歲運 **商名醫類朱**

甘草 密齊口胡松山子出痘在母黄氏懷半夜後此兒却 減半佐視臣人減半共為細末於冬至日修合取雪 山豆根 莫不輕碌人皆神之因命之曰代天宣化九 先見其年所屬者為君次四味為臣君藥倍用臣藥 水煮升麻汁打髮糊為丸辰砂為衣竹葉煎湯下 為君土 佐 君壬木年 黄連、 黄芥 牛蒡子佐 為君火 為此 = + 金 年 黄檗两年年 連翹 佐

欠こする たち 後皆凸醫者病家不可不知 聞掉倒聲視之無他王東樓子出痘有蝙蝠飛入室 出痘有鴉日日聒噪胡淑卿子出痘近夜時樓上忽 在地下蕭楚格子出痘日中時聞影氣過胡三溪子 續名醫類案 三十二

續名醫類案卷三十九				15 15 15 15 15 15 15 15
系卷三十九				& = +
				九